



BEURRÉ BOSCH (Verm. Mass.)

N° 66 du Catalogue Général.



BEURRÉ BLANC DES CAPUCINES.

N° 66 du Catalogue Général.

POIRE BEURRÉ BOSCH.

(VAN MONS.)

no 7. 163.

Arbre vigoureux, d'un port élégant, se formant assez bien en pyramide.

L'écorce de son tronc est lisse, grise; ses branches, grosses, presque verticales, étalées sans épines, ont la peau rude, de couleur gris brun maculé de lenticelles gris pâle.

Les rameaux à fruits courts, gros, éloignés, gris.

Les yeux assez gros, allongés, pointus, brun marron.

Les feuilles, ordinairement au nombre de quatre, sont grandes, larges, cordiformes, pointues, lisses, planes ou en gouttière.

Le feuillage de l'arbre est touffu et sa fertilité moyenne.

Les branches de l'année sont grosses, longues, brun verdâtre, fortement maculées de lenticelles d'un blanc sale, rudes au toucher.

Les yeux petits, écartés, pointus, brun lavé de gris.

Les supports gros, courts, ridés, brun foncé.

Les feuilles, de 10 centimètres de longueur sur 6 centimètres de largeur, sont luisantes, planes, quelquefois en gouttière, cordiformes, pointues, largement ou nullement dentées, recourbées, vert foncé.

Le pétiole, de 4 centimètres de longueur, est gros, cannelé, vert clair.

Les stipules filiformes, dentées.

Le fruit est très-gros, allongé, côté vers l'ombilic ; la peau est rude, jaune clair fortement strié maculé de brun rouge et de quelques tiquettes grises.

L'ombilic est petit, irrégulier, peu enfoncé, gris. Le pédoncule gros, ligneux, cannelé, a 25 millimètres de longueur ; il est brun marron pointillé de brun clair, et implanté au sommet du fruit dans une cavité en entonnoir.

La chair est blanche, fine, fondante, beurrée, d'un sucre acidulé superfin et d'un parfum des plus agréables.

Ce bel et bon fruit mûrit vers la mi-octobre et se conserve jusqu'en novembre.

Il a plusieurs points de ressemblance avec la *Calebasse Bose* du même auteur, mais il lui est supérieur en qualité.



POIRE BEURRÉ BLANC DES CAPUCINES.

Arbre assez vigoureux, qui, greffé sur franc, forme de belles pyramides. Branches grosses, longues, étalées, un peu pendantes, de couleur grise.

Rameaux à fruit minces allongés, rapprochés, gris brun clair très-maculé de petites lenticelles ovales gris roux. Les yeux à fruits sont petits, courts, roux brun. Les feuilles des yeux, au nombre de 5 à 5, sont ou cordiformes pointues ou ovales allongées pointues. Dans le premier cas, leur longueur est de 6 centimètres, leur largeur de 4, et le pétiole a 4 centimètres de longueur.

Dans le deuxième cas, leur longueur est de 8 centimètres, leur largeur de 55 millimètres, et le pétiole de 5 $\frac{1}{2}$ centimètres de longueur.

Elles sont largement dentées, et le plus souvent sans dentelures.

Les rameaux de l'année, moyens, très-longs, flexueux, de couleur brun verdâtre, fortement tachetés de petites lenticelles qui sont comme appliquées sur la peau, et la rendent rude.

Les yeux assez gros, écailleux, ovales pointus, brun lavé de gris.

Les feuilles sur le jeune bois sont presque toujours ovales allongées pointues, rarement cordiformes, planes ou légèrement crispées. Elles ont ordinairement de 8 à 9 centimètres de longueur et de 4 à 5 de largeur. Vert clair.

Le pétiole mince, un peu cotonneux, est long de 4 centimètres, vert très-clair, cannelé, avec les deux rebords vert foncé.

Les supports sont courts, minces, gris tiqueté de brun clair et lignés de gris noir, brun roux et renflés vers leur point d'attache au fruit.

Le fruit, ordinairement réuni de 2 à 3, tient faiblement à l'arbre; il est très-gros, allongé, ventru, se rétrécissant fortement vers l'ombilic, de manière à représenter un angle obtus; il est côté et bosselé, principalement vers la même partie.

L'ombilic, gris noir, est assez grand ouvert, irrégulier, saillant.

La queue, d'environ 3 centimètres de longueur, est fine, sèche, brune, et placée au sommet du fruit dans une cavité profonde, évasée.

L'épiderme est vert herbacé, strié maculé et tiqueté de brun clair; le pourtour de la queue est entièrement lavé de brun foncé.

Chair blanche, crépitante, fondante, eau sucrée abondante assez bien parfumée; maturité du 15 au 30 octobre.

C'est une très-belle et bonne poire, mais qui a été improprement classée parmi les *Beurrés*, car sa chair ne l'est nullement; il faut la soigner à la cucillette et ne pas la laisser mûrir sur l'arbre; elle est à manger aussitôt qu'une légère teinte jaune se répand sur le fruit; plus mûre, elle devient sèche.

Elle est extrêmement sujette à se détacher de l'arbre au moindre vent ou attouchement des branches.

Des scions de cette belle variété de poire ont été envoyés à M. BOUVIER par M. VAN MONS. Je ne puis dire si elle provient de ses semis ou si c'est un fruit qu'il a trouvé dans un ancien couvent, comme son nom semblerait l'indiquer.

