



POIRE BEURRE CURTET. (Rouss.)



POIRE BEURRE (POTTELET, SUIV. CURTET. (Rouss.)

POIRE BEURRÉ CURTET.

(BOUVIER.)



Arbre assez vigoureux, s'élevant très-bien en pyramide sur franc.

L'écorce de son tronc est lisse, grise, lavée de brun.

Ses branches principales sont grosses, bien étalées, et forment, avec le tronc, un angle très-ouvert. Elles ont la peau rude, grise, tachetée de lenticelles gris brun. Ses branches à fruits sont courtes, grosses, rapprochées, de couleur gris cendré tacheté de blanc sale.

Les yeux à fruits sont moyens, obtus, brun fauve.

Les jeunes rameaux sont longs, grêles, brun roux fortement pointillé de brun clair, légèrement duveteux au sommet et coudés à chacun de leurs nœuds.

Les yeux à bois sont petits, rapprochés, pointus, brun foncé, très-écartés du bois.

Les feuilles qui couronnent les yeux à fruits sont moyennes, ovales, crispées, déchiquetées, planes ou en gouttières, pointues ou obtuses et d'un vert assez foncé; celles qui croissent sur les jeunes rameaux sont petites, lancéolées, peu et irrégulièrement dentées; elles se terminent en pointe allongée et effilée. Leur longueur moyenne est de 6 centimètres, leur largeur de 5. Elles sont minces, molles et très-sujettes à se détériorer et à se tacher.

Le pétiole, de 2 à 4 centimètres de longueur, est grêle, cannelé, nuancé de carmin en dessus, vert jaunâtre en dessous.

Les supports sont gros, courts, ridés, brun foncé tacheté de gris clair.

Le fruit du *Beurré Curtet* est petit, turbiné, aussi large que haut.

La peau est fine, lisse, vert jaunâtre ; pointillée de blanc jaunâtre du côté exposé aux rayons solaires ; du côté opposé elle est pointillée de rouge vif ; lavée et flagellée de carmin.

La queue est sèche, moyenne et implantée un peu obliquement dans une légère cavité.

L'ombilic, moyen, irrégulier, noir, est placé dans une cavité profonde et sillonnée.

La chair est blanche, fine, fondante, beurrée ; elle a une légère saveur de *Bergamote*. Ce fruit est du premier ordre.

La maturité de ce fruit a lieu vers la fin de septembre ; on peut le conserver jusque vers la mi-octobre. Il a été obtenu de semis en 1828, par M. Bouvier, de Jodoigne. et dédié à M. CURTET, à cette époque docteur en médecine et professeur à Bruxelles.



POIRE BEURRÉ QUETELET.

(BOUVIER.)

SYNONYME BIS-CURTET.

(Obtenu par moi 191 au B^e Curtet en une seule.)

Ce fruit a été gagné en 1828 par M. SIMON BOUVIER. Il provient du même semis que le *Beurré Curtet*. L'auteur lui avait donné primitivement le nom de *Bis-Curtet*, sans doute à cause de la similitude qui existe entre les qualités de ces deux fruits. Plus tard il lui a donné le nom de *Beurré Quetelet*, sous lequel je l'ai vendu jusqu'à ce jour. La différence qui existe entre le port de ces deux arbres et la forme extérieure du fruit motivent suffisamment ce changement de nom.

Le *Beurré Quetelet* a un port magnifique. Sa tige s'élanche droite et vigoureuse, et ses branches latérales, en se développant, forment naturellement une pyramide. L'écorce de son tronc est très-lisse, gris brun. Ses branches sont grosses, étalées, et forment avec le tronc un angle très-ouvert et presque horizontal. Elles sont gris nuancé de brun, tachetées de nombreuses et larges mouchetures ovales, blanchâtres, qui y sont placées presque toujours transversalement. Les branches à fruits sont de grosseur et de longueur moyennes, très-rapprochées et souvent terminées par une pointe acérée.

Les yeux à fruits sont assez gros, ovales, pointus, brun noir.

Les jeunes rameaux sont gros, longs, lisses, brun roux, entièrement parsemés de mouchetures rondes,

d'un blanc sale, et duveteux vers le quart supérieur de leur hauteur ; ils s'élancent vigoureusement et presque verticalement ; ce n'est qu'à la fin de leur pousse qu'ils prennent une position plus horizontale.

Les yeux sont petits, pointus, brun noir, rapprochés, écartés du bois par un support saillant.

Les feuilles des yeux, de 5 à 6, sont grandes, larges, cordiformes, pointues ; arquées et en gouttières. presque toujours sans dentelures ; sur les jeunes rameaux elles sont moyennes, ovales, lancéolées, pointues et largement dentées ; leur longueur est de 7 centimètres sur 4 centimètres de largeur.

Le pétiole, moyen, cannelé, long de 5 centimètres, celui des feuilles des jeunes rameaux a 6 centimètres de longueur ; dans les feuilles qui couronnent les yeux, il est plus gros, raide, et s'avance horizontalement, de façon que la courbure de la feuille ne commence qu'à sa médiane ; sa couleur est vert clair un peu rosé.

Les stipules sont filiformes dentés.

Les supports gros, courts, ridés, brun foncé.

Le fruit du *Beurré Quetelet* est petit, en forme de Doyenné.

La peau est lisse, vert clair, lavée, striée et tachetée de brun roux. Elle est quelquefois flagellée de carmin du côté exposé aux rayons du soleil, et jaunit fortement à sa maturité.

Le pédoncule, gros, court, est placé au sommet du fruit dans une légère cavité.

L'ombilic, clos, couronné, presque toujours irrégulier et jaunâtre lavé de noir, est placé dans une cavité moyenne.

La chair du fruit est blanche, fondante, beurrée, et présente une telle similitude avec celle du *Beurré Curtet*, qu'il est très-difficile de les distinguer. Son époque de maturité a lieu également dans la première quinzaine d'octobre. C'est un fruit de première qualité.
