



POIRE ALEXANDRE LAMBERÉ (Bonn.)

POIRE BERGAMOTTE SAGERET (Sageret.)

POIRE ALEXANDRE LAMBRÉ.

(BIVORT.)

Bel arbre pyramidal, poussant avec une grande vigueur et qui néanmoins est très-fertile ; son feuillage, quoique touffu, ne lui donne pas cet aspect agréable de la plupart de ses congénères après leur première production, ce qui est occasionné par le peu d'ampleur de sa feuille qui est restée à l'état primitif et dont l'amélioration est de même peu sensible sur les sujets greffés, tandis qu'elle est souvent du double dans d'autres variétés. J'ai dégusté ce fruit pour la première fois en 1844, cependant il est possible qu'il soit de quelques années plus vieux, car l'arbre mère paraît avoir une vingtaine d'années : il portait dans la pépinière Van Mons le n° 2,194 ; cette variété n'est pas encore entièrement consolidée, car, tout en conservant les bonnes qualités qui m'ont engagé à la propager, elle n'a pas encore adopté la constance dans la forme ni la grosseur, et son époque de maturité ayant eu lieu en 1844, durant le mois de mars, s'est trouvée avancée de quatre mois en 1847, année où elle a mûri en novembre.

Les branches principales de la *Lambré* ont une position presque horizontale ; elles sont grosses, grises et rudes ; celles de deux ans sont couvertes d'épines longues et acérées, qui ne se retrouvent plus sur les arbres greffés.

Ses branches à fruits sont minces, courtes, gris brun ; celles que forment les épines sont encore plus grêles que les premières.

Les supports sont courts, minces, ridés, renflés et lisses vers leur point d'attache au fruit, de même couleur que les branches.

Les bourgeons à fruits sont petits, arrondis, pointus.

Les jeunes rameaux sont longs, de grosseur moyenne, lisses, gris blond, maculés de larges lenticelles rondes, blanc sale.

Le bourgeon à bois ovale, pointu, brun lavé de noir apprimé à sa base, écarté du rameau à son sommet. Mérithalles rapprochés.

Feuilles petites, minces, ovales, pointues, quelquefois planes, mais ordinairement à bords relevés en gouttière, largement et uniformément dentées, d'un vert clair ; leur longueur moyenne est de 6 centimètres, et leur largeur de 4 centimètres ; pétiole long de $2\frac{1}{2}$ à 3 centimètres, grêle, légèrement cannelé, vert clair lavé de rose au-dessus.

Stipules assez grandes, lancéolées, dentées.

Fruit petit ou moyen en forme de bergamote, irrégulièrement arrondi ou ovale ; peau lisse, vert clair, tachetée, striée et maculée de roux, légèrement colorée au soleil, jaunissant fortement à l'époque de la maturité ; pédoncule assez gros, ligneux, brun clair, long de 3 à $3\frac{1}{2}$ centimètres, placé dans une cavité assez profonde entourée de légères gibbosités ; calice couronné, souvent irrégulier, placé dans un enfoncement moyen quelquefois côté. Divisions brun noir ; chair blanche, fine, fondante, demi-beurrée ; eau assez abondante, très-sucrée, bien parfumée. C'est un très-bon fruit, dont l'époque de maturité, comme je l'ai dit plus haut, est encore un problème ; en 1844, 1845 et 1846, les fruits étaient petits et ont été généralement consommés en février et mars ; en 1847 ils étaient moyens, et aucun n'a dépassé la fin de novembre.

J'ai dédié cette poire à feu M. ALEXANDRE LAMBRÉ, mon aïeul, grand amateur d'arboriculture, et dont le vaste jardin, qui existe encore en partie, renfermait presque tous les bons fruits connus à cette époque.



POIRE BERGAMOTE SAGERET.

(SAGERET.)

Arbre vigoureux formant une belle pyramide sur coignassier et sur franc, mais peu fertile sur ces derniers sujets, et l'on fera bien de courber ses branches ou de tailler long, afin de l'exciter au rapport. Ses branches principales, grosses, longues, gris brun, sont parsemées de larges lenticelles gris roux, proéminentes ; elles sont presque verticales et forment avec le tronc un angle très-aigu.

Les jeunes rameaux poussent droits, ils sont gros, longs, lisses, gris brun à leur base, brun verdâtre au sommet, maculés de larges lenticelles gris blanc, rondes, assez nombreuses ; le sommet de la pousse d'été est ordinairement teint de rouge.

Les yeux à bois sont petits, allongés, pointus, larges et apprimés à leur base, peu écartés du rameau à leur sommet, brun noir bordé de brun clair et nuancé de gris cendré.

Branches à fruits longues, grêles, brun verdâtre ; supports gros, courts, ridés à leur base, lisses, renflés, vert brun tacheté de blanc sale au point d'attache du fruit.

Feuilles minces, ovales, lancéolées, pointues, sans denture aucune, ordinairement à bords relevés en gouttière, vert clair ; leur longueur moyenne est de 6 centimètres, leur largeur de 4.

Pétiole long de 3 à 5 centimètres, assez gros, vert clair ; la cannelure, qui est peu profonde, est colorée de rouge clair.

Stipules filiformes avec dentures rouge vif.

Fruit moyen, ovale, turbiné, quelquefois arrondi et plus large que haut ; celui qui a servi à cette description mesurait 7 centimètres en hauteur et 8 en diamètre ; peau épaisse, vert jaunâtre pointillé de

brun roux, marbrée de gris et lavée de rouge clair au soleil. Pédoncule gros, raide, ligneux, brun noir, implanté droit au sommet du fruit dans une cavité peu profonde et côtelée. Calice moyen, couronné, placé presque à fleur du fruit ; divisions gris noir, ordinairement caduques. Chair fine, fondante ; eau abondante, sucrée, rappelant assez le parfum des bergamotes. Quelques concrétions pierreuses entourent les loges séminales.

La maturité ordinaire de cette bonne poire coïncide avec la seconde moitié de novembre et se prolonge jusqu'en décembre.

Il paraît que cette variété a été semée par M. SAGERET, pomologiste très-distingué, habitant Paris, et que son premier rapport a eu lieu vers 1830.