



POIRE DÉLICIE DE JODOIGNE (Bouvier.)



POIRE BEUTIN (Bouvier.)

POIRE DÉLICE DE JODOIGNE.

(BOUVIER.)

Arbre d'une vigueur moyenne, se formant bien en pyramide.

Branches principales gris brun, maculées de nombreuses lenticelles rousses, proéminentes, qui en rendent la peau rude et comme verruqueuse : elles forment avec le tronc un angle ouvert.

Les branches à fruits sont grêles, courtes, vert brun en dessous, rougeâtres en dessus, parsemées de lenticelles rondes, roux très-clair, proéminentes.

Bourgeons à fleurs moyens, ovales allongés pointus, brun clair ombré de brun foncé.

Jeunes rameaux de grosseur moyenne, longs, brun verdâtre en dessous, brun rougeâtre en dessus, parsemés de lenticelles blanc sale, arrondies, cotonneux vers leur extrémité. Mérithalles rapprochés, régulièrement espacés.

Gemmes à bois petits, allongés, pointus, brun noir, écartés du rameau par leur sommet.

Feuilles épaisses, rugueuses, vert foncé, larges de $5 \frac{1}{2}$ centimètres, longues de 6 centimètres, ovales ou cordiformes, arrondies, pointues ou obtuses, entières, quelquefois finement serrettées et bordées de brun rouge, rarement planes, mais ordinairement contournées et froncées. Pétiole assez gros, légèrement cannelé, vert au-dessous, lavé de rouge au-dessus, long de 3 à 4 centimètres.

Stipules filiformes.

Supports gros, courts, ridés à leur base, lisses et renflés à leur point d'attache au fruit, de couleur brune.

Fruit moyen ou gros, pyriforme turbiné, irrégulièrement ventru et s'amincissant en pointe obtuse vers le pédoncule : celui-ci, qui est gros et long de 2 à 4 centimètres, est placé presque superficiellement et un

peu de côté à la base du fruit ; quelquefois il est très-court, charnu, presque aussi gros que le support, entouré de petites gibbosités et tel que nous l'avons représenté ci-contre. La peau est fine, lisse, jaune, quelquefois lavée de rouge d'un côté, mais plus ordinairement tachée de larges macules irrégulières de même couleur ; du côté opposé elle est lavée et striée de brun verdâtre, et comme marbrée de blanc sale au ventre et vers le calice, de brun clair autour du pédoncule.

Calice assez régulier, couronné, placé presque à fleur du fruit.

Divisions raides, gris noir.

Chair demi-fine, blanche, fondante ; eau abondante, sucrée, d'un parfum très-agréable. Le fruit bien venu mesure 9 centimètres en hauteur et 7 en largeur.

Sa maturité ordinaire a lieu de la fin de septembre à la fin d'octobre. C'est donc par erreur qu'elle a été portée dans mon catalogue comme mûrissant en novembre et décembre.

M. SIMON BOUVIER, de Jodoigne, est l'inventeur de cette bonne poire ; son premier rapport a eu lieu en 1826.



POIRE SEUTIN.

(BOUVIER.)

Arbre vigoureux quand il est greffé sur franc, et qui adopte facilement la forme pyramidale; branches grisâtres formant avec le tronc un angle ouvert.

Rameaux gros, longs, droits, légèrement coudés, lisses, de couleur noisette; quelques lenticelles ovales, roux clair, peu nombreuses, sont inégalement répandues sur toute leur longueur; la pousse d'été est entièrement cotonneuse. Mérithalles très-espacés.

Gemmes à bois triangulaires, pointus, brun clair, apprimés à leur base, écartés par leur sommet.

Branches à fruits grosses, courtes, grises, ridées vers leur base; supports gros, lisses, brun foncé.

Boutons à fleurs gros, déprimés, pointus, écailleux, brun clair ombré de brun marron.

Les feuilles sur les jeunes rameaux sont étroites, allongées, pointues, en gouttière, arquées, souvent amincies aux deux extrémités, vert clair, cotonneuses dans leur jeunesse, largement et régulièrement dentées; leur longueur moyenne est de 8 centimètres, leur largeur de 4; le pétiole, long de 2 centimètres, est gros, cannelé, cotonneux, vert clair; la nervure médiane est très-grosse et très-apparente. Les feuilles des bourgeons à fruits sont grandes, larges, ovales lancéolées, amincies en longue pointe, planes, finement dentées, d'un beau vert; le pétiole est gros, long de 7 à 8 centimètres, vert jaunâtre.

Stipules lancéolées.

Fruit gros, oviforme-allongé, bosselé, obtus vers le calice et presque pointu vers la base; pédoncule grêle, ligneux, long de $3\frac{1}{2}$ à 4 centimètres, placé superficiellement à l'extrémité; la hauteur ordinaire du fruit est de 9 centimètres et sa largeur de $6\frac{1}{2}$.

Peau vert clair, tachetée et pointillée de brun clair, tachée de même couleur autour du pédoncule ; à la maturité elle jaunit légèrement.

Calice assez régulier, ouvert, couronné, très-proéminent, de manière à empêcher l'assise du fruit.

Sépales raides, gris, ombrés de brun, très-cotonneux.

Chair un peu grossière, fondante ; eau assez abondante et d'un parfum agréable quoique peu prononcé.

La maturité de la *Seutin* a lieu en décembre et janvier ; c'est un bon fruit qu'il faut consommer en temps ; car, trop mûre, la chair de cette poire devient sèche et insipide.

M. BOUVIER, qui en est l'inventeur, l'a dédiée à M. SEUTIN, docteur en médecine et en chirurgie, à Bruxelles.

