



POIRE ROYALE D'ANGLETERRE.



POIRE GROS BILDT.

POIRE ROYALE D'ANGLETERRE.

(Pelté congédine)

Arbre vigoureux, même sur coignassier, dont les branches principales gris brun, rudes, forment avec le tronc un angle très-ouvert.

Jeunes rameaux gros, longs, droits, lisses, légèrement coudés, brun verdâtre du côté de l'ombre, rouge violacé du côté exposé aux rayons solaires, et, vers leur sommet, maculés de petites lenticelles rousses, ovales, peu nombreuses et irrégulièrement distribuées. La pousse de l'été, principalement celle de seconde sève, est très-cotonneuse.

Mérithalles rapprochés et régulièrement espacés; gemmes à bois gros, arrondis, légèrement pointus, écartés, brun noir.

Branches à fruits grosses, courtes, ridées, grises.

Bourgeons à fleurs gros, arrondis, pointus, brun noir.

Supports gros, allongés, renflés, lisses, brun rougeâtre maculé de petites lenticelles rousses, rondes.

Les feuilles sur les jeunes rameaux sont épaisses, lisses, d'un vert un peu jaunâtre, ovales, pointues, largement et profondément dentées, arquées et à bords légèrement relevés; le pétiole, long de 15 millimètres, est gros, largement et profondément cannelé. Celles qui naissent autour des bourgeons à fruits sont lancéolées, aiguës, très-finement dentées et souvent bordées de brun; leur pétiole est long de 4 centimètres, assez gros, légèrement cannelé, jaunâtre nuancé de rouge.

Stipules en forme de languette et lancéolées.

Fruit très-gros, pyramidal, renflé vers son milieu, rétréci vers les deux extrémités. Peau lisse, épaisse

vert olive, fortement colorée au soleil de vermillon et entièrement maculée de rouille. Pédoncule gros, ligneux, ordinairement courbé, long de 25 à 35 millimètres, placé superficiellement à l'extrémité du fruit et quelquefois un peu de côté, dans une légère cavité. Calice irrégulier, situé dans une cavité profonde ; divisions noires souvent caduques.

Chair grossière, sèche, cassante, sans saveur appréciable. C'est un fruit à cuire, qui se conserve jusqu'en mars et avril.

La belle forme de cette poire, son beau coloris et son volume énorme (elle acquiert jusqu'à 17 centimètres en hauteur et 12 en largeur) nous ont engagé à la faire paraître dans l'*Album* et à en conseiller la culture. Bien que j'en aie récolté de très-belles sur pyramide, c'est seulement en espalier qu'elle acquiert ses plus grandes dimensions.

L'origine de cette poire m'est inconnue; je lui laisse le nom qu'elle porte dans nos environs, où M. BOUVIER la cultivait il y a plus de trente ans. Voici ceux qu'on lui donne en outre comme synonymes dans d'autres contrées :

Angora, Belle Angevine, Bolivar, Beauté ou Comtesse de Tervueren, Duchesse de Berry d'hiver, Grosse de Bruxelles.

POIRE GROS-GILOT.

Catillac

La beauté de cette poire nous a engagé à la faire paraître dans l'*Album*, conjointement avec la *Royale d'Angleterre*.

Ces deux fruits sont les plus gros que je connaisse; celui-ci est en outre l'un des meilleurs à cuire et d'une longue conservation. Il est généralement connu sous le nom de *Gros-Gilot* dans les provinces belges wallonnes; ailleurs et dans la plupart des catalogues, on lui donne comme synonyme celui de *Catillac*, synonyme dont j'ignore l'origine.

C'est un arbre vigoureux, qui est ordinairement cultivé en plein vent dans nos vergers, et en espalier et contre-espalier dans quelques anciens jardins de grande étendue. Peu fertile dans sa jeunesse, il acquiert une grande fertilité avec l'âge et dès que l'arbre est entièrement formé. Les branches principales qui forment sa charpente poussent presque droites, s'abaissent graduellement en vieillissant et prennent une position horizontale que le poids des fruits tend plus tard à rendre pendante.

Les branches à fruits sont de longueur et de grosseur moyenne, brun rougeâtre au-dessus, brun verdâtre au-dessous, légèrement parsemées de petites lenticelles rousses allongées; elles sont plus ou moins cotonneuses.

Bourgeons à fruits gros, coniques, pointus, brun nuancé de marron.

Supports gros, courts, ridés.

Jeunes rameaux gros, courts, raides, très-duveteux dans leur jeunesse; sous ce duvet l'épiderme est lisse, luisant, brun rougeâtre au-dessus, brun verdâtre au-dessous, parsemé de quelques lenticelles rousses allongées.

Le bourgeon à bois est gros, arrondi, comprimé, fortement apprimé à sa base, un peu écarté vers son sommet, brun ombré de noir.

Mérithalles inégaux, quelquefois espacés de 5 centimètres, d'autres fois rapprochés de 1 à 2 centimètres, de manière à avoir les deux bourgeons presque à l'opposé l'un de l'autre.

Les feuilles sont moyennes, épaisses, entières, cordiformes ou ovales pointues, vert clair au-dessus, fortement duveteuses au-dessous, à bords relevés ou en gouttière; celles des yeux à fleurs sont beaucoup plus amples que sur les rameaux, et ordinairement planes. Les premières mesurent 6 centimètres en longueur, et $4\frac{1}{2}$ centimètres en largeur; les secondes, 8 centimètres en longueur, et 5 centimètres en largeur. Les pétioles des premières sont gros, larges, aplatis, cotonneux, vert clair, longs de 1 à 2 centimètres; ceux des secondes sont lisses, ronds, cannelés, vert jaunâtre et longs de 4 à 7 centimètres.

Stipules en languettes, cotonneuses comme le support.

Fruit énorme (venu en espalier), pyramidal, irrégulièrement renflé vers son milieu, bosselé, obtus par ses deux bouts, et côté autour du calice. Peau épaisse, raide, vert clair, légèrement lavée de rouge, maculée, tachetée et pointillée sur toute sa surface et plus particulièrement du côté du soleil. Pédoncule faible eu égard à la grosseur du fruit, ligneux, brun noir, long de $2\frac{1}{2}$ à 3 centimètres, placé obliquement et latéralement dans une cavité peu profonde. Calice irrégulier, souvent triangulaire, placé presque à fleur du fruit et entouré de côtes et de gibbosités; divisions caduques. Chair cassante assez pleine de jus, de première qualité cuite. Sa plus grande hauteur est de 15 centimètres, et son plus grand diamètre est de 11 centimètres.

L'époque de sa maturité ordinaire a lieu de février en mai.

