

SECKLE PEAR.

Voici l'historique de cette variété, que je trouve dans le rapport de la commission de pomologie de Rouen, rédigé par M. Prévost :

« Ce fruit est d'origine américaine ; le pied mère doit exister encore près de Philadelphie, sur le sol
» d'une ferme ayant appartenu à M. VON SECKLE. Des greffes ont été envoyées à la Société d'horticulture
» de Paris, au commencement de l'année 1831, par M. DEARBON, président de la Société d'horticulture du
» Massachussetts.

» Le nom que porte cette variété est donc celui de son inventeur, et son introduction en France daterait
» de 1831. »

C'est vers cette même époque que M. Van Mons en a également reçu des greffes de l'Amérique.

L'arbre de la *Seckle*, qui est vigoureux greffé sur franc, se comporte très-mal quand il est greffé sur coignassier, au moins dans mon terrain, qui convient cependant très-bien à ces sortes de sujets ; sa pousse y est insignifiante, son feuillage se couvre de rouille et ses fruits se tachent, se gercent et restent si petits, qu'il ne mériterait aucunement la culture, si l'on n'avait la ressource de le cultiver sur franc ; sur ces derniers sujets, il forme d'assez belles pyramides.

Ses jeunes rameaux, de grosseur moyenne, généralement courts, sont lisses, verdâtres au-dessous et rougeâtres au-dessus, cotonneux vers leur extrémité, parsemés de nombreuses lenticelles blanc sale.

Bourgeons à bois ovales, pointus, bruns, appliqués contre le rameau quelque peu écarté par son extrémité. Mérithalles rapprochés.

Branches à fruits longues, grêles, lisses, brun clair.

Supports courts, lisses, renflés vers leur sommet, brun verdâtre.

Feuilles moyennes ou petites, suivant la vigueur de l'arbre, ovales ou ovales lancéolées pointues, planes ou légèrement arquées vers les deux tiers de leur longueur, d'un vert clair, ordinairement entières ou à dentures très-fines.

Pétiole grêle, long de 4 centimètres, vert blanchâtre au-dessous, souvent lavé de rose au-dessus. Stipules filiformes ordinairement manquants.

Fruit petit, ovale turbiné, presque aussi large que haut. Peau lisse, très-fine, jaune roux, très-colorée de pourpre foncé du côté du soleil, et maculée sur toute sa surface de nombreuses taches de rouille. Le pédoncule, long de 15 millimètres, ridé, vert ombré de brun, est placé quelquefois à fleur du fruit, d'autres fois dans une cavité peu profonde, mais toujours un peu obliquement. Le calice, très-petit, couronné, demi-clos, assez régulier, est placé presque à fleur du fruit; les divisions sont étroites, noires. La chair est fine, beurrée, fondante; son eau est assez abondante, fortement parfumée et rappelle le goût du Rousselet. Le trognon est petit et contient ordinairement huit pepins ovales, pointus, brun clair, noirâtre aux deux extrémités quand ils sont parfaitement mûrs.

C'est un très-bon fruit, qui mûrit vers le commencement d'octobre, mais qu'on doit surveiller au fruitier, car il blettit promptement; le mieux est de le cueillir quelques jours avant sa maturité et graduellement, en commençant par les fruits exposés au soleil.



POIRE BEURRÉ DUMORTIER.

(VAN MONS.)

Arbre vigoureux, se formant bien en pyramide sur franc et sur coignassier. Branches principales étalées, horizontales, gris brun, parsemées de larges lenticelles rousses. Rameaux à fruits longs, grêles, bruns, nuancés de gris.

Yeux à fruits, gros, allongés, pointus, écailleux, brun foncé ombré de marron.

Supports gris, ridés à leur base, brun jaunâtre et lisses à leur sommet.

Jeunes rameaux longs, grêles, légèrement coudés à chaque nœud, presque pendants, contournés; épiderme gris brun au dessus, brun verdâtre au dessous, parsemé de nombreuses lenticelles rousses, rondes, proéminentes. La pousse de l'été est cotonneuse au sommet et ordinairement teinte de rouge, ainsi que les feuilles.

Mérithalles très-rapprochés et irrégulièrement espacés.

Gemme à bois moyen, conique, brun foncé, écarté du rameau par son sommet.

Feuilles moyennes, épaisses, luisantes, ovales pointues, d'un beau vert, entières ou uniformément et régulièrement dentées, planes ou à bords latéraux légèrement relevés, contournés et crispés. Leur longueur moyenne est de 6 centimètres et leur largeur de 4. Pétiole assez gros, cannelé, long de 2 à 4 centimètres, vert blanchâtre.

Stipules filiformes.


Quand cette variété est greffée sur pied franc, il s'y montre ordinairement encore quelques épines; plus le pied est vigoureux, plus les épines sont nombreuses; greffée sur coignassier elle est entièrement inerme;

ses rameaux sont plus gros, plus raides et poussent plus droits ; ses feuilles sont aussi plus grandes, plus épaisses et plus souvent entières.

Fruit petit, pyriforme arrondi ; peau mince, rude, vert très-clair, jaunissant assez fortement à la maturité, striée et tachetée de brun roux, lavée de même couleur aux deux extrémités ; le pédoncule, long de 2 centimètres, est ligneux, de grosseur moyenne, vert lavé de brun ; il est ordinairement recourbé et placé dans une cavité moyenne. Le calice, régulier, étoilé, est fort peu enfoncé ; ses divisions sont foliacées, persistantes, assez longues, brun noir, apprimées sur le fruit. Chair très-fine, fondante, beurrée ; eau abondante, sucrée, agréablement parfumée. Trognon petit, cordiforme ; pepins assez gros, ovales pointus, renflés, brun marron, bien conformés, au nombre de trois ou quatre dans chaque fruit.

C'est une poire de première qualité, dont la maturité a lieu dans la seconde moitié de novembre.

L'arbre mère qui se trouve dans l'ancienne pépinière VAN MONS, à Louvain, peut avoir environ 30 ans. Il est placé en espalier, au couchant ; sa fertilité est moyenne, et à cette exposition ses fruits ne deviennent pas sensiblement plus gros qu'en pyramide. Elle a été dédiée par M. VAN MONS à M. B. DUMORTIER, de Tournay, savant naturaliste, membre de l'Académie des sciences de Bruxelles, et de la chambre des représentants.





SECKLE PEAR (Van Sickle.)



POIRE BEURRÉ DUMORTIER (Van Mons.)