

68. 19
tab. 57



POIRE DOISEINÉ CROTTÉ.



POIRE DE LOUVAIN (Van. Hous)

DOYENNÉ CROTTÉ. (*gris*) *Leroy*

*Décrite en son lieu par M. 101. sous le nom de *Levise à Paris*.*

Peu vigoureux quand il est greffé sur coignassier. le *Doyenné crotté*, enté sur franc, pousse avec beaucoup de vigueur, sans pour cela perdre en rien de sa fertilité; il forme de magnifiques pyramides et se garnit presque naturellement de branches de la base jusqu'au sommet. J'en possède un pied âgé de 17 ans, qui est d'une hauteur de plus de 8 mètres.

Malheureusement, à côté de ces qualités recommandables comme arbre de plein vent, il a plusieurs défauts qui en restreignent un peu la culture; sa feuille, qui est mince et tendre, attire singulièrement les insectes, qui n'en laissent que peu intacts; elle se couvre en outre, dans les années pluvieuses, d'une quantité de taches noires et de taches de rouille; ces mêmes années, le fruit se fendille et devient rogneux à tel point, qu'on en doit jeter la plus grande partie. J'ai remarqué que les fruits produits à la base de l'arbre sont plus attaqués que ceux du sommet.

Malgré ces défauts, qui donnent souvent à l'arbre un aspect peu agréable, nous ne pouvons nous dispenser d'en recommander la culture, car les peines sont largement compensées par la bonne qualité des fruits, lorsque le temps est favorable à leur développement.

En espalier, le fruit devient beaucoup plus gros et la peau en est plus lisse, mais il a moins de qualités.

Les branches à fruits du *Doyenné crotté* sont assez longues, grêles, d'un gris brunâtre; les supports de grosseur moyenne, longs, ridés à leur base, lisses et renflés à leur sommet. Le bouton à fleur est moyen, écailleux, ovale pointu, brun clair, ombré de brun marron et de gris; les jeunes rameaux sont presque droits.

lisses, grêles, de longueur moyenne, un peu flexueux, légèrement duveteux et souvent rugueux vers le bout; leur couleur est jaune noisette, tacheté de petites lenticelles rousses assez nombreuses et irrégulièrement distribuées; les méritalles sont courts; le gemme est ovale, pointu, brun noir, entièrement écarté du rameau. Les feuilles sont minces, lancéolées, allongées, aiguës, ovales pointues, ou cordiformes pointues; ces dernières sont peu nombreuses. Ces trois formes se trouvent souvent réunies autour du même bouton à fruit; sur les jeunes rameaux elles sont ordinairement ovales lancéolées pointues; leur longueur varie de 6 à 9 centimètres, et leur largeur de 3 à 5 centimètres; toutes sont très-légèrement dentées, planes ou à bords latéraux un peu relevés; leur couleur est le vert clair.

Le pétiole grêle cannelé, vert jaunâtre, est souvent teint de rouge au sommet des jeunes rameaux; sa longueur sur ceux-ci est de 15 à 20 millimètres, et de 3 à 6 centimètres lorsqu'il est attaché aux bourgeons à fruits; stipules filiformes.

Fruit petit ou moyen, arrondi, presque aussi large que haut; il mesure en moyenne 8 centimètres de hauteur, sur 7 centimètres de largeur; peau rude, plus ou moins rogneuse et tachée de brun noir, striée et pointillée de brun roux; elle passe, à sa maturité, du vert clair au jaune doré, plus intense du côté du soleil.

Le pédoncule gros, ligneux, long de 13 millimètres, est placé à la base du fruit dans une cavité profonde et arrondie. Le calice moyen, couronné, assez régulier, est peu profondément enfoncé. Les divisions sont raides, d'un brun noir lavé de gris cendré.

La chair est blanche, très-fine, foudante, beurrée; son eau est abondante, sucrée et délicieusement parfumée. C'est un de nos meilleurs fruits; il mûrit du 15 octobre au 15 novembre.

Il est plus généralement connu en Belgique sous le nom de *Philippe strié* et de *Saint-Michel crotté*, que sous celui de *Doyenné crotté* ou *galeux* qu'on lui donne en France, et qui, je pense, est celui qui est le plus juste.



POIRE DE LOUVAIN.

(VAN MONS.)

(d'après Séroy 633. celle-ci se rapporte à la grosse - queue de Séroy 564.)

Arbre fertile, peu vigoureux sur coignassier, et d'une vigueur moyenne quand il est greffé sur franc; rameaux gros, courts, droits, flexueux, duveteux, quelquefois légèrement striés, de couleur noisette, parsemés de lenticelles rousces allongées, peu nombreuses et inégalement disséminées. Mérithalles courts; gemme moyen, d'un brun noir, ovale pointu apprimé à sa base, écarté à son sommet et supporté par un léger renflement; bourgeon à fruit assez gros, allongé, pointu, écailleux, brun noir ombré de brun clair et de gris clair. Lambourdes grosses et courtes, ridées et rugueuses à leur base, fortement renflées à leur sommet, d'un brun noisette, parsemées de nombreuses lenticelles blanc sale, proéminentes. Feuilles d'un vert clair, étroites, ovales lancéolées, pointues, en gouttière, fortement arquées, principalement sur les jeunes rameaux; serrature peu profonde et arrondie; leur longueur varie de 7 à 9 centimètres, et leur largeur de 3 à 4. Pétiole moyen, cannelé, vert clair, cotonneux, long de 1 à 3 centimètres sur les jeunes rameaux, et de 5 à 6 centimètres quand il supporte les feuilles des bourses.

La nervure principale ou médiane est généralement couverte de petits poils noirs et raides, qui se détachent par le frottement; stipules filiformes, souvent manquants. Fruit en trochets de quatre à cinq, assez gros, pyramidal turbiné, souvent un peu arqué, bosselé dans toute sa surface, mais particulièrement vers le pédoncule qui est gros, charnu, long de 2 à 3 centimètres; verdâtre du côté de l'ombre, roux clair au soleil, vert à sa base et brun à son sommet, placé superficiellement et obliquement au sommet du fruit, à la suite d'une gibbosité plus ou moins forte; peau rude, vert herbacé, colorée de carmin vif au soleil, tachetée de gris roux du même côté et de vert du côté de l'ombre; couverte de rouille, principalement vers

le calice, qui est irrégulier, ouvert, placé dans une cavité peu profonde et très-évasée. Divisions assez longues, d'un gris brunâtre, ordinairement caduques.

Le fruit jaunit assez fortement quelques jours avant sa maturité.

La chair est assez fine, blanche, fondante ; eau peu abondante, très-sucrée, agréablement et fortement parfumée. C'est un bon fruit, qui a mûri chez moi, cette année, fin d'août, et qui, d'après les renseignements que je possède, doit mûrir en novembre.

Les fruits nouveaux sont tous sujets à de pareils écarts dans leur forme et leur époque de maturité, et il faut ordinairement un certain laps de temps avant qu'à cet égard ils soient définitivement fixés.

Cependant, comme cette variété date au moins d'une vingtaine d'années, nous sommes portés à croire qu'il y a erreur dans les annotations prises à son égard, et que l'on peut fixer hardiment son époque de maturité dans la première quinzaine de septembre.

Il est aussi possible qu'il existe plusieurs fruits sous ce nom ; celui que M. POITEAU a décrit dans les *Annales d'Horticulture de Paris*, livraison de décembre 1854, me paraît différer du mien.

