



POIRE BON CHRÉTIEN WILLIAM'S.



POIRE VANASCHE (Bouvier.)

POIRE BON CHRÉTIEN WILLIAM'S.

Arbre d'une vigueur moyenne, dont les branches peu nombreuses, mais assez bien agencées, se redressent et forment avec le tronc un angle aigu.

Branches à fruits courtes, moyennes, gris brun.

Supports gros, courts, ridés et gris à leur base ; renflés, lisses et bruns à leur sommet.

Boutons à fleurs bruns nuancés de marron foncé.

Rameaux gros, généralement courts, lisses, poussant obliquement, plus fortement coudés sur les vieux arbres que sur les jeunes ; une strie longitudinale part ordinairement du dessous et du milieu de chaque gemme ; elle est plus apparente sur les rameaux vigoureux des arbres greffés sur franc ayant un certain âge, que sur ceux greffés sur coignassier. Leur couleur est quelquefois d'un gris verdâtre, mais plus souvent gris brun, tachetée de petites lenticelles grises, rousses, rondes ou ovales, peu nombreuses et inégalement distribuées ; ils sont généralement cotonneux dans leur tiers supérieur. Mérithalles courts.

Bourgeon à bois porté sur un renflement plus ou moins fort, selon le coude formé par le rameau ; il est triangulaire pointu, brun noir, apprimé par sa base, écarté par son sommet. Les supérieurs sont ordinairement ombrés de gris et entièrement appliqués contre le rameau, ce qui a aussi lieu sur la pousse vigoureuse et tardive des jeunes arbres.

Feuille moyenne, épaisse, coriace, ovale ou ovale lancéolée pointue, plane ou à bords latéraux légèrement relevés, finement et régulièrement serretée.

Fruit gros ou très-gros, pyriforme pyramidal, haut de 10 centimètres, large de $8 \frac{1}{2}$, fortement renflé

vers son milieu et très-rétréci vers ses extrémités ; affectant, à l'état normal, la forme d'un *Beurre d'Hardempont belge* ou d'un *Bon Chrétien d'hiver* ; parfois il est oviforme allongé, bosselé et côté principalement vers le calice et le pédoncule.

Peau fine, vert très-clair, passant au jaune doré à la maturité du fruit, finement pointillée de gris roux et lavée de roux brun en quelques parties du fruit, mais principalement au pourtour du calice et du pédoncule ; une légère teinte de carmin la colore parfois au soleil.

Pédoncule moyen, long de 15 millimètres, placé obliquement dans une cavité plus ou moins profonde et bosselée.

Calice ouvert, couronné, assez régulier, placé presque à fleur du fruit et quelquefois dans une cavité formée par la proéminence des bosselures dont il est entouré.

Chair blanche, fine, fondante, demi-beurrée ; eau assez abondante, sucrée, agréablement parfumée et un peu musquée.

Cet excellent et beau fruit mûrit en Belgique du 10 au 15 septembre ; il annonce sa maturité par le changement du coloris et par l'odeur qu'il exhale. Nous conseillons beaucoup, afin d'augmenter la finesse de sa chair et de prolonger la durée de sa conservation, de ne pas le laisser mûrir sur l'arbre, mais bien de le cueillir huit jours avant sa maturité.

On connaît peu l'historique du *Bon Chrétien William's* ; voici ce que dit, à ce sujet, M. PRÉVOST, dans le Rapport de la commission de Pomologie de Rouen, page 52 : « Je n'ai encore trouvé sur » l'origine de cette poire qu'une seule indication, laquelle est incomplète. Elle est consignée dans les » *Annales de Flore et de Pomone*. Il est dit, tome IV, page 552, que cette poire a été communiquée au » jardin du Roi par M. LÉON LECLERC, qui l'avait reçue d'Angleterre. »

L'arbre qui a servi à faire la présente description provient de la pépinière du professeur VAN MONS, et peut avoir 15 à 16 ans d'âge ; il est greffé sur racine, ce qui, au premier abord, me l'avait fait regarder pour un arbre franc de semis. Lors de sa première production chez moi, ses fruits étaient en général si beaux (il y en avait de beaucoup plus gros que le modèle), que j'aurais eu peine à reconnaître en eux le *William's*, si l'arbre n'avait été là pour me le certifier.

Cette année (1848) les fruits étaient très-ordinaires.

POIRE VANASSCHE.

(BOUVIER.)

Arbre assez vigoureux pour pyramide et plein vent. Ses branches principales sont bien disposées et forment avec le tronc un angle très-ouvert. Il se met promptement à fruits et produit assez régulièrement chaque année, mais peu abondamment, de ces belles poires dont je donne ici un spécimen.

Ses branches à fruits, de longueur et grosseur moyennes, sont lisses et grisâtres.

Le bourgeon à fruit est moyen, écailleux, ovale allongé, terminé en pointe émoussée et duveteuse, fauve ombré très-légèrement de brun.

Support moyen, court, ridé et gris à sa base, brun verdâtre et renflé à son point d'attache au fruit.

Rameaux gros, longs, légèrement coudés, striés, brun rouge, fortement parsemés de petites lenticelles rondes ou allongées, blanc sale, très-apparentes et irrégulièrement distribuées sur sa surface; ils forment ordinairement avec l'arbre un angle ouvert, mais ils se dirigent aussi parfois horizontalement et en serpentant; le bourgeon terminal est renflé et cotonneux, presque toujours lisse, mais quelquefois rugueux.

Méridithalles courts, irrégulièrement espacés.

Gemmes gros, fortement développés dès la première année, ovales pointus, roux lavé de gris blanc, à base fortement appuyée sur un renflement considérable, écartés du rameau par leur sommet, de manière à former avec lui un angle aigu.

Feuilles ovales ou ovales lancéolées, ordinairement effilées par les deux extrémités, finement serretées, planes, d'un beau vert clair; leur longueur moyenne est de 8 centimètres et leur largeur de 4.

Le pétiole, long de 2 à 3 $\frac{1}{2}$ centimètres, est mince, légèrement cannelé, vert jaunâtre lavé de rouge.
Stipules filiformes.

Fruit très-gros, ovale arrondi, presque aussi large que haut, renflé au milieu et rétréci en haut et en bas, légèrement bosselé et côté vers le calice; il mesure souvent 10 centimètres en hauteur et 9 en largeur. Peau fine, lisse, verte, tachetée de gris brun et colorée de pourpre du côté du soleil: cette poire jaunit fortement à l'époque de sa maturité et les tiquetures passent au gris roux. (Elle n'est cependant pas toujours aussi colorée que notre modèle.)

Pédoncule moyen, eu égard à la grosseur du fruit, long de 15 millimètres, placé dans une cavité légère et bosselée; il est de couleur verdâtre tachetée de gris blanc.

Calice couronné, demi-clos, situé dans une cavité moyenne très-évasée et fortement côtelée. Divisions assez raides, jaunâtres extérieurement et noires à l'intérieur.

Chair blanche, demi-fine, beurrée, fondante; eau très-abondante, sucrée, agréablement parfumée.

C'est un excellent fruit de premier rang, autant en raison de sa grosseur que de sa bonté; j'en ai mangé de parfaitement mûrs dès le commencement d'octobre cette année, et les derniers vers la mi-novembre, mais je ne suis pas encore parvenu à en conserver jusqu'en décembre, dernière limite de maturité que leur assignait M. le notaire BOUVIER, l'inventeur de cette variété, qu'il a trouvée vers 1825 et qu'il a dédiée à M. VANASSCHE, peintre paysagiste, à Bruxelles.

