



POIRE BONNE D'ÉZÉE (Dupuy Jumeau)



POIRE BERGAMOTTE ESPERKIN (Spreng)

# POIRE BONNE D'ÉZÉE.

(DUPUY JAMAIN.)

---

Cet excellent fruit a été découvert par M. DUPUY-JAMAIN, pépiniériste, à Paris, dans un petit hameau nommé Ézée, situé aux environs de Loches (Indre-et-Loire). Quoique son introduction dans le commerce soit assez récente, il y a bien une vingtaine d'années que sa première production a eu lieu.

Arbre vigoureux, affectant naturellement la forme pyramidale, peu difficile sur le choix du sol dans lequel il doit végéter et produisant chaque année de beaux et bons fruits avec une libéralité peu commune : l'espalier augmente sensiblement leur grosseur et n'amoindrit pas leurs excellentes qualités. Comme il ne prospère pas bien sur coignassier, il sera préférable de le placer sur pied franc ; ceci est au surplus un avantage pour cette variété et pour toutes celles qui sont dans le même cas ; car je pense aussi, avec notre célèbre pomologue VAN MONS, que la greffe sur coignassier détériore et vieillit la plupart de nos meilleurs fruits.

Branches à fruits assez grosses, courtes, grises.

Bourgeons à fruits moyens, effilés, de couleur marron foncé, légèrement nuancé de gris argenté, ordinairement entr'ouverts à leur sommet.

Rameaux de grosseur moyenne, courts, ascendants, blond ombré de gris, parsemés de lenticelles arrondies, grises ou roux très-clair ; lisses, luisants, renflés vers l'extrémité et souvent terminés par un bourgeon à fruit.

Gemme à bois effilé, aigu, écailleux, brun marron ombré de brun noir et de gris, à base large et fortement apprimée, écarté par son sommet de manière à former un angle très-ouvert et porté sur un renflement notable.

Mérithalles rapprochés.

Feuilles ovales lancéolées, aiguës, plus ou moins contournées, à dentelures peu profondes et assez régulières, d'un beau vert et restant sur l'arbre plus longtemps que celles de tous les autres.

Fruit gros, pyriforme allongé, ventru, presque en forme de calebasse; pédoncule arqué, ligneux, de grosseur moyenne, long de 2 à 5 centimètres, quelquefois implanté dans une cavité régulière et peu profonde, d'autres fois déplacé par une gibbosité se présentant ainsi de côté et superficiellement attaché.

Peau lisse, vert pâle jaunissant insensiblement jusqu'au jaune d'or à sa maturité et se colorant parfois du côté frappé par les rayons solaires, maculée de quelques taches rousses et pointillée de vert.

Calice petit, assez régulier, peu enfoncé et évasé; divisions noires, étalées, persistantes.

Chair blanche, très-fine, très-fondante; eau très-abondante, sucrée et d'un parfum des plus agréables.

La maturité de la *Bonne d'Ézée* a lieu dès le commencement de septembre et se prolonge jusqu'au commencement d'octobre; c'est une des variétés les plus exquises de la saison; elle porte le nom du hameau où elle fut trouvée.

Je l'ai reçue dans le temps sous les noms de *Belle et bonne d'Ézée* et de *Bonne des Zées*.

---

# POIRE BERGAMOTE ESPEREN.

(ESPEREN.)



Bel arbre pyramidal, d'une grande vigueur et d'un aspect magnifique, entièrement inerme, mais ayant encore cependant quelques épines rudimentaires à la base des rameaux vigoureux; branches principales grosses, et formant avec le tronc un angle très-ouvert; branches à fruits courtes, de grosseur moyenne, grises.

Bourgeons à fruits moyens, ovales, aigus, écailleux, brun marron fortement nuancé de gris argenté.

Supports moyens, fortement ridés et grisâtres à leur base; lisses, renflés, brun clair à leur sommet.

Rameaux droits, raides, gros, longs, légèrement coudés aux nœuds, brun roux du côté du soleil, plus grisâtres du côté de l'ombre, parsemés de lenticelles rondes, roux très-clair, peu nombreuses et inégalement distribuées, ordinairement striées au milieu de chaque gemme; lisses, luisants, mais quelque peu rugueux vers leur sommet.

Méridhalles régulièrement espacés.

Gemme à bois conique pointu, gris-cendré ombré de marron, apprimé à sa base, écarté par son sommet et porté sur un léger renflement.

Feuilles lancéolées ou ovales-lancéolées pointues, quelquefois effilées aux deux extrémités, finement ou non dentées, d'un vert jaunâtre; leur longueur est de 6 à 7 centimètres et leur largeur de 2 à 5  $\frac{1}{2}$  centimètres.

Pétiole mince, jaunâtre, long de 3 à 5 centimètres.

Fruit en forme de Bergamote: peau rude, verte, tavelée de roux sur toute sa surface et jaunissant légèrement à l'époque de sa maturité; pédoncule de grosseur moyenne, long de 2 centimètres, ligneux, brun nuancé de vert, légèrement arqué, placé dans une cavité arrondie et peu profonde. Calice petit, irrégulier, légèrement enfoncé et entouré de quelques petites gibbosités; divisions noires.

Chair blanc rosé, très-fine, fondante; eau abondante, sucrée, agréablement parfumée et rappelant le goût des Bergamotes.

C'est un fruit délicieux, qui mûrit en mars et avril; il a été obtenu de semis par le major ESPEREN vers 1850; c'était de tous ses gains celui dont il faisait le plus de cas.

