


POIRE SURPASSE MEURIS (Van Mous.)



POIRE SIMON BOUVIER (Bouvier.)

POIRE SURPASSE-MEURIS.

(VAN MONS.)

Arbre vigoureux, se disposant naturellement à la forme pyramidale et prospérant également bien sur franc et sur cognassier ; son bois forme avec le tronc un angle très-ouvert, presque horizontal et se dispose à l'inclinaison ; rameaux à fruits grêles, assez longs, bruns ; supports grêles, courts, fortement ridés à leur base, lisses et peu renflés à leur sommet. brun foncé ; bourgeons à fleurs petits, coniques, aigus, brun marron fortement nuancé de gris cendré.

Rameaux à bois gros, longs, droits, lisses, gris verdâtre dans leur moitié inférieure, légèrement striés, rouge violacé dans leur moitié supérieure ; de petites lenticelles rousses, rondes ou ovales sont inégalement distribuées sur toute leur surface. Gemmes petits, coniques, pointus ou obtus, brun foncé, fortement apprimés, excepté ceux du sommet du rameau, qui sont un peu écartés par leur pointe.

Mérithalles réguliers, très-courts.

Feuilles ovales, arrondies, apiculées, à serrature large et peu profonde, planes, d'un beau vert clair ; sur lambourdes, elles sont entières ou très-finement serretées, et parfois naviculées. Leur longueur moyenne est de 8 centimètres et leur largeur de 6 centimètres. Le pétiole est gros, cannelé, vert clair, long de 5 centimètres. Les stipules filiformes.

Le fruit est moyen, déprimé, arrondi en forme de bergamote ; il mesure 8 centimètres en hauteur et $8\frac{1}{2}$ en largeur. La peau en est rude, entièrement couverte de rouille : le pédoncule est grêle, vert à sa base, noir à son sommet, placé à fleur du fruit, surmontant un petit mamelon. Le calice est très-large, ouvert, couronné, placé à fleur du fruit : ses divisions sont noires, en partie caduques.

Chair blanche, jaunâtre, demi-fine, fondante ; eau abondante, sucrée, légèrement acidulée et ayant une saveur toute particulière, exquise. Pepins gros, ovales, obtus, aplatis d'un côté, brun clair.

L'époque de maturité de cet excellent fruit est la mi-octobre ; nous savons qu'il provient des semis du professeur VAN MONS. mais sans pouvoir assigner une date certaine à l'époque de sa première production.



POIRE SIMON BOUVIER.

(BOUVIER.)

Arbre d'une vigueur moyenne, qu'on greffe sur franc plutôt que sur cognassier, comme pyramide ou haute tige.

Rameaux à fruits assez longs, grêles, gris.

Supports grêles, ridés à leur base, lisses et brun clair à leur sommet.

Bourgeons à fruits petits, coniques, pointus, brun fauve ombré de brun plus foncé.

Rameaux longs, grêles, légèrement flexueux et striés, cotonneux vers le bout; écorce brun clair du côté de l'ombre, parsemée de lenticelles fauves proéminentes, rouge violacé du côté du soleil et couverte de nombreuses lenticelles rondes, concaves, de couleur gris argenté.

Gemmes saillants, coniques, pointus, brun clair.

Mérithalles courts et irréguliers.

Les feuilles des rameaux sont moyennes, vert clair, ovales pointues, ordinairement amincies par les deux bouts; leur serrature est large, arrondie et assez profonde; elles mesurent $7 \frac{1}{2}$ centimètres en longueur sur 5 en largeur. Sur lambourdes elles sont plus grandes et plus arrondies; leur serrature est très-fine, très-régulière et très-pointue; feuilles secondaires lancéolées pointues.

Le pétiole est grêle, vert très-clair, long de 25 à 70 millimètres.

Stipules linéaires.

Le fruit est petit, pyriforme; la peau en est lisse, vert clair, ponctuée et maculée de gris brun, ombrée de même couleur autour du pédoncule, qui est de grosseur moyenne, long de 2 centimètres, brun verdâtre,

légèrement arqué et placé presque superficiellement à la base du fruit : calice petit, irrégulier, inséré dans une cavité peu profonde et évasée ; divisions noires.

Chair blanche, très-fine, très-fondante, bien parfumée et même un peu musquée, exquise.

C'est un excellent fruit, qui mérite d'être cultivé quoique petit ; sa maturité a lieu vers le commencement de septembre et se prolonge pendant deux à trois semaines ; il provient des semis de M. SIMON BOUVIER : sa première production a eu lieu vers 1818.

