

BIGARREAU MONSTRUEUX DE MEZEL.

Voici l'historique de cette variété, que nous extrayons des Annales de la Société centrale d'horticulture de France, vol. XXXVIII, page 25.

« La Revue horticole du 15 décembre 1846 a mentionné sous ce nom un bigarreau nouvellement » décrit et figuré dans le Bulletin de la Société d'horticulture de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), et qui » paraît mériter d'occuper une place parmi nos fruits d'été.

» Ce bigarreau n'est pas un fruit nouveau, mais un fruit négligé, oublié depuis trente ans, dans une vigne à Mezel, près de Clermont, et qui sans l'institution de la Société d'horticulture de cette ville serait resté ignoré jusqu'à sa mort; son nom veut dire sans doute qu'il est le plus gros des bigarreaux connus. Les commissaires chargés d'aller en prendre connaissance ont constaté que onze de ces fruits pesaient un hectogramme, ce qui donne 110 fruits pour un kilogramme. Sa qualité a été reconnue excellente et son noyau a été trouvé petit, ce qui est aussi une qualité. Sa maturité arrive dans la première quinzaine de juillet; alors on en trouve de brun foncé, de rouges, de roses, etc.

» M. Bravy, habile horticulteur, pépiniériste à Clermont, s'est empressé de le multiplier par la greffe, » et il est à même d'en fournir de jeunes pieds aux amateurs. »

Ce sont deux de ces pieds qui nous ont été livrés en 1847, par M. Bravy, et que nous avons conservés en arbre mère, qui nous ont produit cette année (1850) quelques fruits et mis à même de faire connaître cette variété aux abonnés de l'Album.

Le bigarreau de Mezel est un arbre assez vigoureux et qui paraît très-fertile; ses jeunes rameaux sont gros, assez longs, gris, nuancés de brun roux et ponctués de petites lenticelles fauves, arrondies et pro-

éminentes; ils ont une grande propension à l'inclinaison, et il faut surveiller les écussons dès l'instant de leur pousse, sans quoi celle-ci s'avance horizontalement, et il est ensuite difficile de la ramener à la ligne verticale sans former à sa base un coude très-disgracieux. Ses feuilles sont amples, minces, ovales lancéolées, pointues; leur dentelure est irrégulière et peu profonde; elles sont glabres en dessus et poilues en dessous; d'un vert tendre et très-sujettes à jaunir ou à se tacher quand elles sont exposées à un soleil trop ardent ou à des pluies continues. Leur longueur varie de 15 à 22 centimètres, et leur largeur de 7 à 10 centimètres. Le pétiole qui les supporte est gros, profondément cannelé, vert clair et lisse en dessous, rouge pourpre et poilu en dessus, long de 4 à 5 centimètres; on remarque, de chaque côté de la cannelure et près de la lame, une forte glande ovale, déprimée et ordinairement concave en dessus, rouge pourpre.

Les stipules, larges, crénelées et teintes en rose à leur base, sont ensuite linéaires et vertes.

Le fruit, très-gros, aussi large que haut, mesure 22 à 50 millimètres; il est sensiblement rétréci vers son sommet et aplati de deux côtés; il est parfois légèrement cordiforme, mesurant jusqu'à 55 millimètres en hauteur et 52 millimètres en diamètre. La peau est très-luisante, assez épaisse et très-adhérente à la chair; d'abord d'un rose pâle strié de rouge, elle passe au brun noir strié de pourpre foncé lors de la maturation. Le point pistillaire est petit, rond, roux et proéminent; la couture est superficielle; le pédoncule, long de 5 à 6 centimètres, est grêle, placé dans une cavité large et arrondie. La chair est ferme, succulente, d'une saveur douce, sucrée, très-bonne, ressemblant à celle du bigarreau noir, mais plus relevée.

Le noyau est petit, ovale; il mesure 43 millimètres en hauteur et 9 en largeur; ses joues sont lisses, convexes; les arêtes dorsales, obtuses ou légèrement tranchantes, sont séparées par un sillon large et profond.

Le bigarreau de Mezel est un excellent fruit et une bonne acquisition dont nous sommes redevables à M. LIGIER DE LA PRADE, amateur de fruits qui l'a fait connaître à la Société d'horticulture de Clermont-Ferrand. L'époque de sa maturité est de 15 jours plus tardive qu'en France; elle a commencé chez moi vers la mi-juillet, et les derniers fruits étaient mûrs au commencement du mois d'août.