



VÉZOUSTIÈRE (Léon Léclerc.)

BERGAMOTTE BOUSSIÈRE.

POIRE VÉSOUZIÈRE.

(LÉON LECLERC.)

L'arbre est assez vigoureux et se forme bien en pyramide ; il est préférable de le greffer sur franc que sur cognassier ; ses branches sont grises et forment avec le tronc un angle ouvert.

Les rameaux à fruits sont moyens, gris.

Les bourgeons à fleurs assez gros, ovales, obtus, brun clair nuancé de brun foncé.

Les supports sont petits, gris blond, ridés à leur base, renflés à leur sommet.

Les jeunes rameaux sont longs, grêles, striés, un peu coudés et cotonneux. L'épiderme rouge violacé est ponctué de quelques petites lenticelles ovales, gris roux. Les rameaux, très-vigoureux, sont fortement coudés ; les lenticelles y sont plus nombreuses, plus grandes et saillantes, principalement du côté de l'ombre où leur couleur est fauve et celle de l'épiderme gris blond. Le gemme petit, triangulaire, pointu, apprimé à sa base et écarté à son sommet sur les rameaux ordinaires, est conique, pointu, totalement écarté du bois et porté sur un renflement notable sur les seconds ; son coloris est brun ombré de brun noir.

Les mérithalles sont assez courts, irréguliers.

Les feuilles sont petites, ovales-lancéolées ou lancéolées-pointues, partiellement serretées, vert clair. Le pétiole, long de 3 à 4 centimètres, est grêle, cannelé, vert clair.

Les stipules sont filiformes.

Le fruit est petit, arrondi ; sa forme est celle d'une petite bergamote crassane ; il mesure 50 millimètres en hauteur, son diamètre est de 55 millimètres. La peau, vert clair, est panachée et ponctuée de roux, légèrement ombrée de même couleur autour du pédoncule et maculée de taches restant vertes à

l'époque où le fruit en mûrissant passe au jaune clair. Le pédoncule grêle, ligneux, renflé à son sommet, brun clair, long de 50 millimètres, est placé dans une cavité très-petite et très-étroite. Le calice, irrégulier, ouvert, se trouve dans une cavité assez profonde, arrondie et très-évasée; ses divisions sont noires, en partie caduques. La chair est blanche, demi-fine, un peu grenue autour des loges séminales, mais bien fondante; son eau est suffisante, sucrée et légèrement parfumée. Les pepins sont assez gros, ovales pointus, brun clair; les loges très-larges proportionnellement à la grosseur du fruit.

Cette poire appartient aux semis de M. LÉON LECLERC, pomologue distingué, à qui nous sommes déjà redevables de plusieurs bonnes variétés de fruits, entre lesquels il faut distinguer la *poire Van Mons*, sous le double rapport de la beauté et de la bonté.

La *vésouzière* est un bon fruit, dont l'époque de maturité commence dès les premiers jours de novembre et se prolonge jusqu'en décembre.



POIRE BERGAMOTE BOUSSIÈRE.

J'ai introduit cette variété nouvelle en Belgique l'an dernier ; l'arbre que j'ai reçu provient des pépinières de MM. JAMIN et DURAND, à Paris ; il est greffé sur cognassier et pousse vigoureusement sur cette sorte de sujet ; il se comporte convenablement en pyramide et promet d'être très-fertile ; il m'a produit dès l'année de sa plantation quelques fruits, dont le plus beau a servi à faire cette description. Quant au lieu de provenance de cette variété, elle est d'origine belge ; suivant les renseignements que MM. JAMIN et DURAND ont eu l'obligeance de me communiquer, elle provient d'arbres sauvages envoyés par VAN MONS à la *Société centrale d'horticulture de Paris* ; ces arbres furent distribués entre divers sociétaires, et ce fut dans le jardin d'un d'entre eux, M. BOUSSIÈRE, que celui-ci produisit pour la première fois, en 1844, un fruit jugé digne de la multiplication et auquel la Société a donné le nom de celui qui en avait été l'éleveur.

Les rameaux à fruits de la *Boussière* sont assez gros, longs, gris brun.

Les supports, de même couleur, très-gros, longs, ridés à leur base, fortement renflés, lisses et ponctués de lenticelles rousses à leur sommet.

Les bourgeons à fleurs sont assez gros, coniques, pointus, brun ombré de brun marron et de gris cendré.

Les jeunes rameaux sont gros et courts, renflés et légèrement cotonneux à leur sommet, lisses et sans stries. L'épiderme, gris blond, est ponctué de petites lenticelles rousses, ovales ou allongées, proéminentes, très-nombreuses et très-apparentes.

Le gemme est triangulaire pointu, légèrement saillant, apprimé à sa base, écarté à son sommet, brun clair ombré de brun noir.

Les feuilles sont moyennes, ovales arrondies, pointues, entières ou partiellement serretées, à bords légè-

rement relevés en gouttière, vert clair ; elles mesurent 7 centimètres en longueur et $5\frac{1}{2}$ en largeur. Sur lambourdes, elles sont ovales allongées, pointues, d'un vert plus foncé, et leur serrature est large, arrondie et peu profonde ; elles mesurent 9 centimètres en longueur et $4\frac{1}{2}$ en largeur, et sont portées sur des pétioles longs de 6 à 7 centimètres. Les feuilles secondaires sont lancéolées, pointues, arquées ; leurs bords sont relevés en gouttière, finement et régulièrement serretés. Le pétiole qui supporte les feuilles des rameaux est assez gros, cannelé, vert clair, long de 5 centimètres.

Les stipules sont linéaires.

Le fruit est moyen, turbiné-pyriforme. La peau vert clair jaunit à la maturité ; elle est panachée et ponctuée de gris roux et ombrée de même couleur autour du pédoncule ; celui-ci moyen, long de 15 à 25 millimètres, est placé à fleur du fruit. Le calice se trouve dans une cavité assez profonde. Ses divisions sont caduques. La chair est jaunâtre, assez fine, fondante ; son eau est abondante, sucrée, vineuse et agréablement parfumée, sans que son arôme ait aucun rapport avec celui des anciennes bergamotes. C'est donc à la forme du fruit que son nom se rapporte. Quelques concrétions pierreuses entourent les loges séminales et diminuent tant soit peu le mérite de cette variété, qui atteint cependant la première qualité.

Sa maturité ordinaire aux environs de Paris a lieu fin de novembre et se prolonge quelquefois jusqu'en janvier.

Les fruits que j'en ai récoltés sur sujet transplanté ont mûri dès la fin du mois d'octobre.