



BEURRE SPOELBERG.

BEURRE DE MONTGÉRON.

POIRE BEURRÉ DE SPOELBERG.

VICOMTE DE SPOELBERG.

(VAN MONS.)

Arbre assez vigoureux et très-fertile. même lorsqu'il est greffé sur franc ; son bois, gros, gris, pousse d'une manière diffuse, en partie droit, en partie horizontal ; il est toujours plus ou moins contourné, arqué, et son sommet se redresse souvent parallèlement à la tige ; il demande donc quelque soin pour parvenir à en former des pyramides régulières. Ne l'ayant greffé sur cognassier que depuis deux ans, je puis cependant constater sa réussite sur cette essence où il paraît conserver les mêmes allures que sur le sujet franc.

Ses branches à fruits sont grêles, grises, quelquefois terminées par une épine courte et acérée.

Les bourgeons à fleurs sont assez gros, coniques, pointus, cotonneux, brun ombré de gris.

Les supports moyens, fortement ridés à leur base ; lisses, un peu renflés et ponctués de nombreuses lenticelles rousses, proéminentes à leur sommet.

Les jeunes rameaux sont assez gros, longs, cotonneux, droits, striés, plus ou moins arqués et sinueux, renflés à leur sommet, qui est parfois terminé par un bourgeon à fleur ; hors ce cas, l'œil terminal est ordinairement assez gros, velu et d'une couleur fauve très-apparente ; l'épiderme est brun noisette, lustré de gris et finement ponctué de petites lenticelles rousses et allongées.

Le gemme est triangulaire pointu, apprimé à son sommet comme à sa base, très-cotonneux, brun lavé de gris.

Les mérithalles sont moyens et assez réguliers.

Les feuilles sont moyennes, ovales lancéolées, largement incisées, lisses, coriaces, d'un vert sombre, arquées et à bords fortement relevés en gouttière, portées sur des pétioles grêles, cannelés, vert clair, longs de 15 à 25 millimètres; sur lambourdes, elles sont plus grandes, planes et portées sur des pétioles de 4 à 6 centimètres; leur longueur varie entre 6 à 9 centimètres, et leur largeur entre 5 à 5.

Les stipules sont linéaires.

Le fruit est moyen ou gros, turbiné, fortement renflé, aplati vers le calice et rétréci vers le pédoncule; il ressemble beaucoup à la poire *Frédéric de Wurtemberg*, mais il n'est pas aussi coloré; sa hauteur moyenne est de 7 centimètres et son diamètre de 6.

La peau est lisse, très-légèrement flagellée de rouge au soleil ou fortement ombrée de roux fauve dans cette partie ainsi qu'autour du calice et du pédoncule; elle est en outre panachée et ponctuée de roux, et tachetée de vert du côté de l'ombre. Le pédoncule, long de 3 centimètres, est gros, un peu charnu, cannelé, arqué, brun noisette en dessus, brun roux en dessous et renflé à ses deux bouts; il est placé à fleur du fruit. Le calice, couronné, ouvert, se trouve dans une très-petite cavité, souvent placé superficiellement; ses divisions sont très-courtes, charnues, roux brun. La chair est blanche, fine, fondante, beurrée; son eau est abondante, sucrée, fortement parfumée et musquée; quelques grains entourent les loges séminales mais n'ôtent rien au mérite du fruit qui est excellent. Les pepins sont gros, renflés, brun noir, étroitement serrés dans leurs loges. A l'époque de sa maturité, qui a lieu en novembre et se prolonge jusqu'en décembre, la *de Spoelberg* répand une odeur musquée.

Cette variété appartient aux semis du professeur VAN MONS, qui en a donné pour la première fois la description dans la *Revue des Revues* du mois d'avril 1850, à la page 262; elle a été dédiée par l'auteur à M. le vicomte DE SPOELBERG DE LOWENJOU, près de Louvain.

POIRE BEURRÉ DE MONTGERON.

Arbre très-vigoureux, même sur cognassier, et néanmoins assez fertile ; il pousse peu de branches latérales, et sa tige a une telle propension à s'élever, que, faute de la rabattre très-court chaque année, l'arbre resterait entièrement dégarni.

Les branches à fruits sont courtes, grosses, grises.

Les supports moyens, fortement ridés et gris à leur base ; lisses, bruns, allongés et sans renflement à leur sommet.

Le bourgeon à fleur est moyen, conique, assez souvent obtus, brun ombré de brun noir et de gris cendré.

Les jeunes rameaux sont gros, longs, droits, légèrement striés et arqués, cotonneux et renflés à leur sommet. L'épiderme, gris blond ombré de brun vers le bout du rameau et du côté du soleil, est ponctué de quelques petites lenticelles ovales, blanc sale, irrégulièrement disséminées.

Le gemme est gros, déprimé, obtus, de couleur brun noir, lavé de gris argenté ; à la base du rameau, il est apprimé et légèrement écarté par le bout à son sommet.

Les mérithalles sont irréguliers, très-courts ou très-longs.

Les feuilles sont grandes, lancéolées ou ovales lancéolées, à serrature profonde et régulière ; elles sont épaisses, coriaces, d'un beau vert luisant, planes, parfois contournées ou crispées ; leur longueur est de 7 à 9 centimètres et leur largeur de 3 à 4.

Le pétiole, assez gros, cannelé, vert clair, est long de 25 à 35 millimètres.

Les stipules sont linéaires.

Le fruit est moyen, régulièrement pyriforme; l'épiderme est vert coloré de rouge orangé du côté du soleil, ombré de brun autour du pédoncule et ponctué de taches noires comme il s'en trouve sur le *doyenné crotté ou galeux*; à l'époque de la maturité il ne jaunit que partiellement et conserve de larges taches vertes. Le pédoncule, long de 45 millimètres, est ligneux, brun, arqué, renflé à sa base comme à son sommet et aminci vers son milieu; il se trouve parfois placé un peu de côté à fleur du fruit. Le calice, étoilé, ouvert, est placé dans une cavité large et peu profonde; ses divisions sont raides, vertes à leur base et brunes à leur sommet.

La chair est blanche, demi-fine, demi-beurrée, fondante; son eau suffisante, sucrée, a un léger goût de rousselet.

Le *beurré de Montgeron* est d'origine française; il y a une dizaine d'années que je l'ai reçu de ce pays comme nouveau; il est de bonne qualité et mûrit vers la fin de septembre.

