



POIRE COLMAR.

POIRE COLMAR D'HIVER.

Arbre assez vigoureux, peu fertile, se formant bien en pyramide sur franc ou sur cognassier, mais qu'il convient de cultiver en espalier aux expositions du levant et du midi, sous le climat de la Belgique, si l'on veut jouir de ses produits.

Ses branches à fruits sont grêles, d'un gris brun.

Les supports sont moyens, très-ridés à leur base, renflés et lisses à leur sommet.

Les bourgeons à fleurs sont moyens, coniques, pointus, brun clair ombré de brun foncé et de gris argenté.

Les jeunes rameaux sont médiocrement gros et longs, lisses ou sans stries, droits et seulement un peu coudés sur les plus vigoureux ; ils sont en outre cotonneux et rugueux à leur sommet ; l'épiderme est gris brun, ponctué de petites lenticelles grises assez nombreuses, mais peu apparentes.

Les gemmes sont gros, saillants, coniques, pointus, brun fauve ombré de brun foncé et de gris ; ceux du centre sont portés sur des rudiments de lambourde de quelques millimètres de longueur ; sur les rameaux faibles, le gemme est triangulaire, aplati et peu saillant.

Les mérithalles sont assez longs et irréguliers.

Les feuilles sont grandes, oblongues, pointues, planes, entières ou partiellement serretées, froncées, arquées et à bords parfois relevés en gouttière ; elles sont d'un vert foncé, luisantes, et se tachent facilement de rouille à l'arrière-saison. Leur longueur est de 10 centimètres et leur largeur de 6 à 7. Le pétiole est gros, cannelé, vert clair, long de 55 millimètres. Les stipules sont filiformes.

Le fruit est gros ou très-gros ; en espalier il acquiert jusqu'à 12 centimètres en hauteur sur 10 centi-

mètres de diamètre; sa forme est plus ou moins arrondie; le fruit est tronqué aux deux extrémités et parfois pyriforme turbiné, mais ordinairement plus large que haut. L'épiderme, vert clair, jaunit légèrement à l'époque de la maturité; il est ponctué de petits points bruns, et parfois légèrement coloré de rouge du côté du soleil. Le pédoncule, long de $2\frac{1}{2}$ centimètres, gros sans être charnu, est ordinairement placé dans une cavité assez profonde, entourée de quelques bosses; parfois il est à fleur du fruit. Le calice, irrégulier, est assez enfoncé; ses divisions sont noires.

La chair est blanc jaunâtre, assez fine, fondante, demi-beurrée; son eau est suffisante, sucrée et d'un parfum agréable.

L'époque de sa maturité arrive de janvier en mars.

C'est un fruit de première qualité dans un sol léger et chaud; il est souvent médiocre dans les sols froids et argileux.

Le *Colmar*, qui porte aussi les noms de *poire Manne* et de *belle et bonne*, et que DUHAMEL écrit *Colmart*, nous paraît dater du commencement du XVIII^e siècle, vu le silence qu'ont gardé à son égard les pomologues antérieurs à cette époque. COUVERCHEL dit qu'on le cultive beaucoup dans les environs de la ville de Colmar, d'où son nom paraît provenir.

